

子宮頸縫合術

國泰綜合醫院產房 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 前言

「子宮頸閉鎖不全」意指妊娠中期，發生無痛性的子宮頸變薄及擴張，並合併羊膜由子宮頸滑出或破裂，造成胎兒提早娩出，造成原因不明。子宮頸縫合術是藉由手術方式，將閉鎖不全的子宮頸縫合起來，可避免孕婦因子宮頸閉鎖不全而導致流產或早產。

■ 手術前注意事項

- 手術前應排空膀胱。
- 手術期間必須有家屬陪同。

■ 手術過程

- 協助注射點滴，由醫師執行子宮頸縫合術。
- 手術過程中醫師會視你的狀況給予止痛針。

■ 手術後注意事項

- 手術後孕婦會建議住院觀察一天。
- 陰道會有少量的點狀出血，傷口癒合約3天左右。
- 手術後應多休息，避免雙腳交疊、久站、爬高及蹲姿。建議6週內避免激烈運動及搬提重物。
- 多攝取液體及蔬菜、水果，養成每天排便習慣，以防便秘（建議避免使用甘油球灌腸）。
- 大、小便後請由前往後（肛門）擦拭，預防感染。
- 有下列情況時請立即返院求診：陰道出血、發燒、腹部疼痛、子宮收縮等。
- 手術後請按預約時間回門診檢查，與醫師討論後才可以恢復性生活。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論
若有任何疑問，請洽
國泰綜合醫院 (02)27082121 產房轉 3551-2
汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 產房轉 2601-2
新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 產房轉 2751-2
我們將竭誠為您服務！
國泰綜合醫院關心您！

AE1V1.215.2013.12 七修