

羊膜穿刺術

國泰綜合醫院產房 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 前言

懷孕 14~20 週左右實施羊膜穿刺術，目的是協助遺傳學之診斷。

■ 手術前注意事項

- 檢查前需排空膀胱
- 超音波檢查胎兒週數大小及羊水量等。

■ 手術過程

- 檢查時採平躺姿勢，請儘量將身體放輕鬆。
(手術過程中，勿隨意變動姿勢。)
- 消毒腹部，並在超音波引導下執行羊膜穿刺術。
- 穿刺部位如針孔大小，以無菌透明膠布覆蓋，當日採淋浴方式洗澡前即可撕掉。
- 手術結束會再以超音波觀察胎兒的活動情況，若無異常情

況可返家休息。

■ 手術後注意事項

- 羊膜穿刺的合併症很少。大約有 1% 的孕婦會有輕微腹脹、腹痛等情況。
- 羊膜穿刺術後不需飲食限制，應多休息，避免粗重工作。
- 如有下列症狀請立即返院檢查：
 - ◆ 有不尋常的胎兒過度活動或無胎動。
 - ◆ 破水或陰道有異常分泌物流出(如大量透明分泌物或出血)。
 - ◆ 子宮收縮或劇烈腹痛。
 - ◆ 發燒或全身顫抖。
- 手術後 5~7 天，需返回婦產科門診作複診
已為您預約：

____月____日____午 ____門診追蹤檢查。

- 約手術後 2~3 週，可返回婦產科門診看正式報告。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論
若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 產房轉 3551-2
汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 產房轉 2601-2
新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 產房轉 2751-2

我們將竭誠為您服務！ 國泰綜合醫院關心您！

AE1V1.221.2013.12 九修